

二価鉄配合

鉄力あくあ[®] F10



低温期・高温期
日照不足時の樹勢維持
成り疲れの改善に!!



効果事例



愛知製鋼株式会社

吸収しやすい鉄分で生育促進！

鉄力あ<あ[®] F10

根からも葉からも
吸収します



100mL ボトル



1L ボトル



2L ボトル



20L ボトル

特長

- 有機酸錯体構造により、吸収力が優れます。
- 2千～3万倍希釈の高濃度原液ですので経済的です。

成分

Fe 15,000mg/L
Mg 3,000mg/L
Ca 3,000mg/L

適応作物

果菜類、葉茎類、
根菜類、果樹類、
花卉類

ボトル サイズ

100mL、1L、2L、20L

比重

1.1g/cm³

施用方法

	希釈倍率	原液量 (100Lあたり)	施用間隔の 目安	施用の タイミング
葉面散布	2,000倍 ～ 5,000倍	50mL ～ 20mL	1～2週間に 1回	成長点を 中心に 散布
養液栽培	5,000倍 ～ 10,000倍	20mL ～ 10mL		灌水時に 混用
水耕栽培	5,000倍 ～ 30,000倍	20mL ～ 3mL		水耕液に 混用

使用上の注意

- アルカリ資材との混用を避けてください。
- 有機成分を配合していますので、希釈後長期間保管するとカビ等の発生の原因になります。タンク投入後速やかに使い切ってください。
- 保管中に沈殿物が生じることがありますが、効能には影響ありません。
- 直射日光や高温を避け、原液のまま本ボトルで保管してください。
- 植物や栽培環境によっては、過剰症が発生する恐れがありますのでご注意ください。
- リン酸を含む肥料と混合すると、沈殿を生じることがあります。リン酸を含む肥料と混用する場合は、ご使用の直前に混合し、速やかに使い切ってください。

注意



- 本品は飲み物ではありませんので、飲まないでください。
- 密栓のうえ、幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
- 万一誤って目に入った場合、水道水でよく洗い流し、医師の処置を受けてください。
- このボトルは可燃物です。火気周辺に置かないでください。

●お取り扱い店

※商品パッケージの材質、デザイン、形状等は予告なく変更することがあります。

トヨタグループ

愛知製鋼株式会社

〒476-8666 愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地

<https://www.aichi-steel.co.jp>

e-mail: tetsuriki@he.aichi-steel.co.jp

TEL.0120-603-937

2021.7